



Zell Chemie
INTERNACIONAL

FUMIXIN 57 %

**FUMIGANTE-FOSFINA
FOSFURO DE ALUMINIO**

El **Fumixin 57%** es un producto ideal para controlar: **Gorgojo del frijol** (*Acanthoscelides obtectus*), **Carcoma del tabaco** (*Lasioderma serricorne*), **Gorgojo dentado de los granos** (*Oryzaephilus surinamensis*), **Barrenillo de los granos** (*Rhizipertha dominica*), **Gorgojo del arroz** (*Sitophilus oryzae*), **Gorgojo de las harinas** (*Tribolium confusum*), **Gorgojo Kapra** (*Trogoderma granarium*).



Tipo de almacén / mercancía	Dosis / Tableta	Temperatura	Tiempo de Exposición
Silos: Fumigación de cereales a granel en estructuras verticales.	2 a 5 por tonelada	10 a 15 °C 16 a 20 °C 21 °C o superior	120 horas 96 horas 72 horas
Almacén horizontal: Cereales a granel.	2 a 3 por tonelada	10 a 15 °C 16 a 20 °C 21 °C o superior	120 horas 96 horas 72 horas
Mercancía empacada: cajas de cartón permeables, granos, harinas, nueces, especias en sacos.	1,6 por m3	10 a 15 °C 16 a 20 °C 21 °C o superior	120 horas 96 horas 72 horas
Fumigación de espacios: molinos, estructuras vacías y bodegas.	0,7 por m3	10 °C o superior	24 horas
Mercancías diversas: tabaco, pieles, lana, madera, subproductos de origen animal y vegetal.	2 a 5 por tonelada o 2,1 por m3	10 a 15 °C 16 a 20 °C 21 °C o superior	120 horas 96 horas 72 horas
Semillas de cualquier tipo.	2 a 3 por tonelada	10 a 15 °C 16 a 20 °C 21 °C o superior	120 horas 96 horas 72 horas

Presentaciones: Botellas un kilogramo

